



A-C : Khromov et al. (1998)

インド・西太平洋 Indo-West Pacific

ML 10 cm. 外套膜は楕円形。後端から棘は出ない。腕はほとんど等長。交接腕は基部寄りの吸盤が2列になり中央は広く空く。触腕吸盤は6列であるが、中央付近の数個は著しく大きい。貝殻は卵円形で平たく、浅い溝がある。横線面の前縁は丸い。内円錐は平低で横に広い。外円錐は側方に広がらない。棘は無く小瘤があるのみ。西部インド洋のサヤデマルハ・バンク及びその付近。

Mantle elliptical, with blunt posterior end. Arm almost subequal. Hectocotyized arm with widely spaced biserial suckers proximally. Tentacular suckers in six rows. Mesial several suckers greatly enlarged. Shell oval and flat with shallow median groove. Locular boundary round. Inner cone flat and wide. Outer cone not winged laterally. No spine present, but with small knob. Western Indian Ocean, Saya-de-Malha Bank and neighborhood.

[A. 背面 : B. 貝殻腹面 : C. 触腕]



A-C : Voss & Williamson (1971)

インド・西太平洋 Indo-West Pacific

FAO 名 (英) : Voss' cuttlefish

ML 70 mm. 外套膜は卵円形で、前背葉は突出。触腕掌部の反口側泳膜は僅かに長く、吸盤は8斜列に並び、2~5個の中列吸盤は著るしく拡大している。貝殻は長楕円形で、幅は長さの25%。横線面の前縁は丸い。内円錐はV型で鋭い側肢がある。外円錐は狭い盃状。刺には肋がある。ホンコン付近。付記 : Voss & Williamson (1971) が *S. omani* とした種。

Small sepiid. Mantle oval with protruded dorsal lobe. Tentacle club with a little long swimming keel, suckers in eight oblique rows. 2-5 mesial suckers extremely enlarged. Shell elongate oval, SW 25% of SL. Locular boundary round. Inner cone V-shaped with sharp lateral limbs. Outer cone narrow, cup-shaped. Spine sharp with strong ridge. Hong Kong.

[A. 背面 : B. 貝殻腹面 : C. 触腕]

