



A, B : Voss (1963)

ML 16mm. 外套長は幅の約2倍。外套縁の側部は突出して眼を被う。鰭は小さい(鰭幅は外套長の43.7%)。頭部は外套幅より広い。腕吸盤は2列。III腕とIV腕の間の腕間膜は触腕柄基部を包み込み、むしろ鞘状で特異。触腕は短く吸盤は6列。雌しか知られていないので、交接腕の変形は不明。フィリピン群島(ミンドロ島)。

ML as twice as MW. Lateral margins project forward shielding eyes in form of broad-angled lappets. Fins samall (fin width 43.7% ML). Arm suckers biserial. Interbrachial web between Arms III and IV envelopes basal portion of tentacle stem completely exhibiting unusual sheath-like apperance. Tentacle short, with six rowed suckers. Hectocotylus unknown. Mindoro Island, the Philippines.

[A. 背面(♀12.3mm) ; B. 左III・IV腕及び触腕(♀)]



A : Lu (Hollis) (1998a)

ML 40mm. 外套膜はドーム型で、外套膜前縁は頭部と癒着している。鰭は長卵形で、前端は外套膜縁に近づく。外套膜前縁は房状になっている。腕は短い。触腕掌部には微細な吸盤が20列に密生している。体背面は青及び褐色と白色の縦縞が、外套膜から腕にかけて走り、その他に赤や黒点を散らす。オーストラリアの西岸～東南岸の浅所に普通。

Tiger dumpling squid. Mantle dome-shaped, fused with head. Fins elongate oval reaching at anterior mantle margin. Mantle edge lacinated laterally. Arm short. Tentacular club with minute suckers in 20 rows. Blue, brownish and olive white longitudinal stripes run all over dorsal surface with reddish and black spots. Common in shallow waters from west to southeast Australia.

[A. 背面]

