

A: 田川 勝 (東シナ海), B, C: 夏刈 (1984)

日本近海 Japanese Waters

FAO名(英): Kobi squid


市場名: コイカ (地方名)

ML 10 cm. ジンドウイカ *L. japonica* Hoyle, 1885 とそっくりであるが、やや細身で体色が赤みがかっている。II・III腕の中央付近の大吸盤の角質環の基部寄り 1/2~3/4 は広い一枚の板で、先端寄りの歯は、長さとは幅は等しく 6~9 枚、又触腕の吸盤は 4 列で中央付近の 3~4 対の吸盤が特大で角質環歯が全くないのが特徴。

付記: 触腕大吸盤角質環に歯がない種は少なく、日本には他に前種ウイジンドウイカがあるが、この方は腕吸盤角質環歯が横長で 3~6 枚なので区別される。 *Loligo kobeensis* Hoyle, 1885 やヨコヤジンドウイカ *L. yokoyae* Ishikawa, 1925, *L. rhomboidalis* Burgess, 1967 は本種の異名。南西日本、東・南シナ海、タイ湾。

Resembling *L. japonica* but has thinner body and more reddish in color. Sucker rings of Arms II and III with broad long plate proximally and 6-9 square teeth distally. Central suckers of tentacular club with smooth rings. *Loligo kobeensis* Hoyle, 1885, *L. yokoyae* Ishikawa, 1925 and *L. rhomboidalis* Burgess, 1967 are synonyms. Southwestern Japan, the East and South China Seas to the Gulf of Thailand.

[A. 背面 (♀86mm); B. III 腕大吸盤角質環; C. 触腕大吸盤角質環]



A: 田川 勝 (長崎)

日本近海 Japanese Waters

FAO名(英): Bigfin reef squid

市場名: モイカ, パショウイカ, クツイカ, ミズイカ, イズイカ (地方名)

ML 35 cm, 体重 1.8kg. 鰭が大きく、外套長の 90% 以上に及び、卵円形の外形であるため、コウイカ類と見誤られるが、石灰質の貝殻はなく、幅の広い軟甲をもち、ヤリイカ科に属する。外套膜背面から鰭基部にかけて断続的な淡色横縞がある。腕吸盤は 2 列でその角質環には 20 本内外の三角形の歯がある。雄の左 IV 腕は交接腕化し、先端の 25% ぐらいは吸盤がなく円錐の肉嘴が 2 列に並ぶ。触腕の吸盤には 14~23 の鋭歯がある。卵嚢には通常 5 個の卵が入っている。南西日本~東南アジア・インド洋。

Oval fin reaches more than 90% of ML. Sucker rings with about 20 triangular teeth. Tentacular sucker rings with 14-23 sharp teeth. Male left Arm IV hectocotylized. Suckers of distal quarter lost, instead a double row of fleshy papillae present. Egg cases contain five eggs each. Widely distributed throughout the Indo-Pacific.

[A. 背面 (♂205mm)]

