


アメリカ大陸 Americas

FAO名(英): Dart squid

ML 11.5 cm. 中型からやや小型のヤリイカ類。外套膜は雌の方が太く長い。鰭は小さくハート型で外套長の1/3位。腕吸盤の角質環には10~11の四角く低い歯が並んでいる。触腕は短かめで、吸盤4列。中央の6~8個は著しく大きく環歯は細く鋭い。最も特徴的なのは雄の交接腕化したIV腕で、右腕は吸盤は正常であるが、腹側に半円形の肉片がある。左腕は基部に2~3の吸盤があるのみで、先端は鞭状に著しく延長し肉嘴が櫛の歯状に並んでいる。カリフォルニア湾からペルー。*Loliolopsis chiroctes* Berry, 1929は異名。

Small loliginid with short, heart-shaped fins. Arm sucker rings with 10-11 square teeth. Tentacular sucker rings with slender and sharp teeth. Hectocotylus consisted of fleshy crest on right Arm IV and whip-like prolongation bearing comb-like papillae in left Arm IV in male. Gulf of California to Peru. *Loliolopsis chiroctes* Berry, 1929 is a synonym.

[A. 背面(♂98mm); B. 背面(♀95mm); C. 交接腕]



A, B: Berry (1929). C: Roper et al. (1984)




アメリカ大陸 Americas

FAO名(英): Caribbean reef squid

ML 20 cm. 日本産のアオリイカ同様、鰭が外套長の90%以上に及び全体で楕円形のアウトラインをもつ。腕の大吸盤の角質環歯は鈍縁で丸味があり同大。触腕吸盤は4列に並び、この環歯は長く鋭い三角形の歯である点、アオリイカと酷似している。雄の左IV腕が交接腕化し、先端の1/4は吸盤が無く吸盤柄が肥厚し肉嘴列となる。通常の分布域はバミューダからフロリダ、ブラジルの暖海であるが、海流の関係によって遠く北方のウッズホール(マサチューセッツ州)あたりに出現した記録がある。

Oval fins attains more than 90% of ML. Arm sucker rings with blunt and subequal teeth. Tentacular suckers in four rows, of which rings bear sharp triangular teeth. Left Arm IV of male hectocotylized with abrupt reduction of suckers at distal quarter of arm, instead, rows of papillae, which are transformed into thickened pedicels. From Bermuda to Florida and Brazil.

[A. 背面]



A: Roper (1977)

