

**ササキテカギイカ** *Gonatus madokai* Kubodera & Okutani, 1977 / テカギイカ科 Gonatidae

FAO 名 (英) : Madoka's gonate squid


ML 39 cm. 筋肉はややゆるい。尾部は長大で、鰭が大きく菱形。長さは外套長の 56%，幅は 49%。腕は長く、特に III 腕は外套長と同長。触腕は掌部中央に大小 2 鉤がある。亜寒帯北太平洋・オホーツク海。北東太平洋に同所的分布をする 6 種はいずれも小型 (外套長 19 cm 以下) のに比し、本種は本属中では最大級である。卵を傘膜下に哺育する習性がある。

Body soft with long tail. FL 56% and FW 49% of ML, respectively. Arms long, particularly Arm III as long as ML. Tentacular manus with one large and one small hooks. This is the largest species among the genus. Subarctic North Pacific, and the Sea of Okhotsk. Brood egg mass under umbrella.

[A. 腹面 (♀329mm) ; B. 触腕]



A : Kubodera & Okutani (1977). B : 窪寺恒己




**ニセテカギイカ** *Eogonatus tinro* (Nesis, 1972) / テカギイカ科 Gonatidae

ML 12 cm. 外套膜は円筒形、鰭は丸みがある。眼は大きく膨れる。腕には外縁吸盤列と内 2 列の鉤列がある。触腕には等大の吸盤が密生し、鉤はない。亜寒帯北太平洋、ベーリング海。付記：触腕に小吸盤が密生する点はドスイカ属 *Berryteuthis* に似るが、歯舌の 1 横列が 5 歯 (ドスイカ属は 7 歯) である点から Nesis (1972) は *Gonatus* の亜属とした。

Mantle cylindrical. Fins round laterally. Head with large, bulbous eyes. Arms with marginal suckers and mesial hooks in double row. Tentacle manus with numerous minute suckers of equal size. No hook developed in club. Club with numerous suckers without hook similar to that of *Berryteuthis*. This species has only five teeth in a transverse row of radula instead of seven in *Berryteuthis*. Nesis (1972) thus established *Eogonatus* as a subgenus of *Gonatus*. Subarctic North Pacific and the Bering Sea.

[A. 腹面 ; B. 同 (175mm) ; C. 触腕]



A : 窪寺恒己 (北海道). B, C : Nesis (1972)

